

ПРИКАЗ

«12» августа 2020г.

№ 27

О подготовке к новому учебному году в условиях новой коронавирусной инфекции

В соответствии с Санитарно - эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 за № 16

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План профилактических мероприятий в условиях сохранения риска коронавирусной инфекции COVID-19 (приложение № 1).
2. Утвердить инструкцию по дезинфекции помещений Центра (приложение 6), инструкцию по применению средства дезинфицирующего «Жавель Солид» (приложение 6/1).
3. Утвердить памятку для родителей и обучающихся в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (приложение 2, 3).
4. Администратору Кротовой Л.М. разместить памятку для родителей и обучающихся на информационном стенде в срок до 15 августа 2020 года.
5. Старшему администратору, ответственному по обеспечению охраны труда работников, Крамар Н.В.
 - организовать и контролировать проведение ежедневной дезинфекции помещений (при необходимости два раза в день) и учебных кабинетов (приложение 6);
 - провести внеплановый инструктаж для сотрудников организации по соблюдению техники безопасности, личной гигиены и мерах профилактики вирусной инфекции и ознакомить с памяткой (приложение № 4);
 - подготовить и осуществлять регулярный контроль за графиком проветривания помещений (приложение 5), качеством проведения ежедневной влажной уборки;
 - обеззараживать воздух в помещениях Центра облучателями-рециркуляторами согласно графику (приложение 7);
 - уведомить родителей (законных представителей) о необходимости представить в Центр медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к пребыванию в образовательной организации, если ребенок болел COVID-19 или контактировал с заболевшим.
6. Администраторам и педагогам дополнительного образования осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущению нахождения таких обучающихся на учебных местах (приложение № 4).

7. Старшему администратору и инспекторам охраны проводить термометрию обучающихся и сотрудников с занесением в «Журнал измерения температуры в отношении лиц с показателями 37, 1 и выше»; не допускать нахождение в Центре родителей и посетителей без средств индивидуальной защиты.
8. Старшему методисту Пелиной Н.В. разместить настоящий приказ на официальном сайте, стенде для размещения информации.
9. Администратору Кротовой Л.М. ознакомить сотрудников Центра с настоящим приказом под подпись.
10. Ответственность за осуществление контроля за соблюдением противоэпидемических мероприятий в Центре и контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



И.Г. Немкова

**План профилактических мероприятий
в условиях сохранения риска коронавирусной инфекции (COVID-19)
в Центре дополнительного профессионального образования**

Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
Организационные мероприятия		
Приобрести: <ul style="list-style-type: none"> • СИЗ – маски и перчатки; • дезинфицирующие средства; • бесконтактный термометр; • антисептическое средство для заправки дозаторов; • одноразовые стаканчики, бахилы. 	01.09.2020	администратор Л.М. Кротова
Подготовить здание и помещения к работе: <ul style="list-style-type: none"> • установить на входе в Центр и в санузлах дозаторы с антисептиками для обработки рук. Вывесить рядом с дозаторами наклейку с инструкцией по использованию 	01.09.2020	старший администратор Н.В. Крамар
Провести генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму	31.08.2020	
Разместить на информационных стендах, официальном сайте, группах Центра в социальных сетях памятки по профилактике вирусных инфекций	31.08.2020	старший методист Н.В. Пелина
Санитарно-противоэпидемические мероприятия		
Проводить усиленный фильтр учащихся и работников: <ul style="list-style-type: none"> • термометрия с помощью бесконтактных термометров; • опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. 	перед занятиями	инспектор охраны, педагог
Проводить немедленную изоляцию больных учащихся в свободный кабинет до приезда родителей (законных представителей), или немедленное сообщение родителям (законным представителям) о самочувствии учащихся.	по необходимости	администратор
Проводить обработку рук кожными антисептиками при входе в помещение Центра, в туалетах.	регулярно	обучающиеся и работники
Проводить уборку учебных кабинетов и помещений для работников с применением эффективных при ви-	ежедневно	технический персонал

Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
русных инфекциях дезинфицирующих средств.		
Обеззараживать воздух в кабинетах с помощью бактерицидной установки	по графику	старший администратор
Проветривать учебные кабинеты (в отсутствие обучающихся) и помещения для работников.	по графику	инспектор охраны, педагоги
Проверять наличие антисептика в дозаторах.	ежедневно	инспектор охраны
Мероприятия по безопасности обучающихся в ходе учебной деятельности		
По возможности рассадить по одному человеку за партой, чтобы обеспечить дистанцию между ними не менее 1,5 м.	при необходимости	старший администратор, педагоги
Отменить массовые мероприятия.	постоянно до особого указания	директор
Проводить семинары, собрания и иные мероприятия с участием различных рабочих групп и комиссий в дистанционной форме.	постоянно до особого указания	директор
Ограничить допуск посетителей в здание.	постоянно до особого указания	инспектор охраны
Мероприятия при ухудшении санитарной обстановки		
<p>Перевод:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на дистанционное обучение обучающихся; • дистанционную работу педагогических работников 	через три дня после оглашения распоряжения учредителя	директор

**Памятка для родителей в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19**

С 01.09.2020 года в связи с рекомендациями Роспотребнадзора (Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16) по организации работы образовательных организаций, школа будет работать в следующем формате:

1. Вход в Центр будет разрешен **ТОЛЬКО** обучающимся и работникам Центра.
2. Посещение Центра при необходимости родителями обучающихся возможно только при наличии средств индивидуальной защиты.
3. Все контакты с педагогами и администрацией Центра будут осуществляться по средствам телефонной и электронной связи (включая родительское собрание через ZOOM);
4. Приход детей в строго отведенные время с обязательной термометрией на входе. Будут использоваться бесконтактные термометры.
5. Перед выходом ребенка в Центр измерять температуру тела: если температура тела выше 37 градусов, оставить ребенка дома, вызвать врача.

Обеспечить и ежедневно проверять перед выходом в Центр у ребенка наличие:

- антисептика (рекомендован для индивидуальной обработки рук ребенка);
- маски (рекомендована на тот случай, если ребенок почувствовал себя плохо, чтобы обезопасить окружающих, пока он дойдет до медицинского кабинета);
- питьевой воды (в индивидуальной упаковке).

6. При выявлении данных симптомов в школе ребенок будет незамедлительно изолирован до прибытия родителей (законных представителей). Если у ребенка после проведенного обследования в медицинском учреждении выявляется коронавирусная инфекция, родители обязаны сообщить об этом администрации Центра по номеру телефона 8-81378-34829.
7. Рекомендуем проводить постоянные беседы с ребенком о правилах гигиены (мытьё рук, использование дезинфицирующих средств, обязательное ношение сменной обуви и т.д.). В Центре установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук на входе, в туалетах Центра.

Также дети могут иметь с собой любые необходимые средства защиты.

**Памятка для обучающихся в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19**

1. Перед занятиями в Центре самостоятельно или с помощью родителей измерять температуру своего тела. Если температура тела 37 градусов и выше, сообщить родителям, воздержаться от посещения занятий в Центре.
2. Приходить в Центр необходимо в строго назначенное время (по расписанию занятий). Время нужно уточнить у педагога или администратора (кабинет № 5).
3. При входе необходимо измерить температуру, обработать руки антисептиком и обязательно надеть бахилы (выдаются на входе). Затем необходимо проследовать в свой кабинет.
4. Рекомендуем иметь с собой по необходимости антисептик, маску, питьевую воду в индивидуальной упаковке.
5. В перемену кабинет проветривается по определенному графику. В это время обучающиеся находятся в коридоре вблизи кабинета в соответствии с разделительной полосой. Постарайся исключить контакты с обучающимися других групп. Перемещаться по Центру без необходимости нельзя.
6. Регулярно в течение дня дезинфицируйте руки с помощью антисептиков, размещенных в Центре (на входе, в туалете и др.).
7. **Дополнительные меры профилактики коронавирусной инфекции:**
 - а) **регулярно мойте руки мылом или антисептиком;**
!!! Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть коронавирус, мытье рук с мылом и антисептиком его убьет.
 - б) **соблюдай личную гигиену**
!!! Что делать? Закрывай рот и нос салфеткой или сгибом локтя (НЕ РУКОЙ), когда чихаешь или кашляешь. Сразу после выкидывай салфетку и тщательно мой руки. **Нельзя** прикрывать рот и нос руками, потому что микробы попадут на руки, а потом на все, что ты трогаешь. Так и распространяется коронавирус.
!!! Зачем это нужно? Так ты предотвратишь распространение коронавируса.
 - в) **соблюдай дистанцию в Центре, школе и в общественных местах.**
!!! Зачем это нужно? Коронавирус передается по воздуху. Им можно заразиться, вдыхая воздух рядом с больным. Поэтому держись от людей в общественных местах на расстоянии минимум 1м.
 - г) **если тебе стало плохо, сразу сообщи педагогу, медицинскому работнику в школе, родителям**
!!! Зачем это нужно? Чем раньше ты обратишься за медицинской помощью, тем выше шанс быстро выздороветь и никого не заразить.

**Памятка для педагогов дополнительного образования в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19**

С 01.09.2020 года в связи с рекомендациями Роспотребнадзора (Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16) по организации работы образовательных организаций, Центр будет работать в следующем формате:

1. Приход на работу не менее чем за 10 минут до начала урока занятий.
2. Обязательно прохождение фильтра с термометрией. При малейших признаках респираторных, кишечных заболеваний и повышенной температуры тела работник должен самоизолироваться в домашних условиях, принять необходимые меры и сообщив администрации. С момента выявления указанных лиц в Центру в течение двух часов обязана уведомить Роспотребнадзор о заболевшем работнике;
3. Педагог дополнительного образования должен всегда иметь при себе средства индивидуальной защиты, при необходимости использовать на уроке.
4. Педагог дополнительного образования обязан проводить обучающихся после занятий до выхода. В случае если обучающийся ожидает прихода родителей, то
5. Все контакты с родителями (законными представителями) осуществляются только по средствам телефонной и электронной связи (включая родительские собрания через ZOOM);

В Центре установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук на входе, в туалетах Центра. Также дети могут иметь с собой любые необходимые средства защиты.

Уважаемые коллеги, администрация Центра старается сделать все, чтобы нахождение в Центре было безопасным для всех участников образовательного процесса. Рассчитываем на Вашу поддержку и понимание в сложившейся ситуации. Вместе у нас всё получится!

ГРАФИК ПРОВЕТРИВАНИЯ

Учебные помещения проветриваются во время перемен. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание учебных помещений.

Продолжительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от температуры наружного воздуха

Наружная температура, °С	Длительность проветривания помещения, мин
От +10 до +6	4-10
От +5 до 0	3-7
От 0 до -5	2-5
От -5 до -10	1-3
Ниже -10	1-1,5

График обеззараживания учебных помещений облучателем-рециркулятором

День недели	Время	Кабинет	Примечание
Понедельник	9:00-10:00	7	
	10:00-11:00	8	
	11:00-12:00	15	
	12:00-13:00	19	
Вторник	9:00-10:00	7	
	10:00-11:00	8	
	11:00-12:00	13	
	12:00-13:00	15	
	13:00-14:00	17	
Среда	9:00-10:00	14	
	10:00-11:00	17	
	11:00-12:00	19	
Четверг	9:00-10:00	7	
	10:00-11:00	8	
	11:00-12:00	13	
Пятница	9:00-10:00	7	
	10:00-11:00	8	
	11:00-12:00	15	
	12:00-13:00	13	
	13:00-14:00	14	
	14:00-15:00	19	
Суббота	11:00-12:00	14	
	12:00-13:00	17	
Воскресенье	9:00-10:00	17	

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПРИ КОРОНАВИРУСЕ

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция по проведению дезинфекции помещений при коронавирусе разработана на основании Письма Роспотребнадзора от 23 января 2020 года № 02/770-2020-32 «Об инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами». Действие инструкции распространяется на всех работников, принимающих участие в проведении дезинфекции и обработки помещений.

1.2. Данная инструкция по дезинфекции помещений при коронавирусе содержит основные требования, предъявляемые к дезинфекции помещений в организации и личной гигиене работников, особенностям проведения профилактических мероприятий, санитарной обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия для противодействия распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.3. В связи с неблагоприятной ситуацией по новой коронавирусной инфекции работники (администраторы, уборщики производственных помещений, инспектора охраны) допускаются к работе после прохождения внепланового инструктажа по изучению профилактических мер по предупреждению распространения инфекции, детального изучения данной инструкции, а также с соблюдением всех мер предосторожности.

1.4. Согласно рекомендаций Роспотребнадзора, для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп:

хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%);

кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0%);

катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) - четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%);

третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%);

полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%);

спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе).

Порядок использования отдельных дезинфекционных средств, рекомендуемых органами Роспотребнадзора, и режимы дезинфекции приводятся в инструкциях по применению используемых средств.

1.5. Работники с целью соблюдения требований по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции должны:

- строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса COVID-19 на территории организации (учреждения), в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;

- соблюдать рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для работников;

- оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается к работе и направляется в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе возможно только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении;

- содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, уборочный инвентарь;

- содействовать и сотрудничать с руководителем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю или иному должностному лицу о любом ухудшении состояния своего здоровья, в т.ч. о проявлении

признаков новой коронавирусной инфекции;

- выполнять все нормы и обязательства по охране труда, установленные коллективным договором, соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями;

- внимательно выполнять свои должностные обязанности, не отвлекаться;

пользоваться и правильно применять СИЗ, одноразовые маски носить согласно правилам ношения маски при коронавирусе, одноразовые перчатки, а также кожные антисептики для обработки рук, дезинфицирующие средства согласно условиям и характеру выполняемой работы;

- при отсутствии средств защиты и дезинфицирующих средств незамедлительно ставить в известность об этом прямого руководителя;

- незамедлительно уведомлять прямого или вышестоящего руководителя о любой ситуации, несущей угрозу жизни или здоровью работников и окружающих, о происшедшем несчастном случае, ухудшении состояния своего здоровья;

- придерживаться всех требований и предписаний по нераспространению новой коронавирусной инфекции;

- знать пути передачи, признаки заболевания и меры профилактики коронавирусной инфекции, инструкцию по профилактике коронавируса в организации, методы предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

1.6. Работники должны знать, что механизмами передачи коронавирусной инфекции являются воздушно-капельный, контактный, фекально-оральный пути.

1.7. Работники обеспечены, согласно установленным нормам, санитарной одеждой, санитарной обувью и санитарными принадлежностями, дезинфицирующими средствами.

1.8. Обслуживающему персоналу, занимающемуся дезинфекцией помещений, необходимо:

- неукоснительно соблюдать меры личной гигиены;

- производить смену масок не реже 1 раза в 3 часа;

- обрабатывать руки дезинфицирующими средствами;

- иметь запас дезинфицирующих средств, необходимый технический инвентарь в достаточном количестве.

1.9. С целью предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции, желудочно-кишечных, паразитарных и иных заболеваний работникам необходимо знать и строго соблюдать нормы и правила личной гигиены:

- коротко подстригать ногти, не наносить на них лак;

- тщательно мыть руки с мылом (обладающим дезинфицирующим действием) перед тем как начать работу, переходя от выполнения одной операции к другой, после перерыва в работе, прикосновения к загрязненным предметам, а также после посещения санузла, перед приемом пищи и по окончании работы.

1.10. Обслуживающий персонал несет ответственность за соблюдение требований данной инструкции по проведению дезинфекции помещений при коронавирусе согласно законодательству Российской Федерации.

2. Санитарно-гигиенические требования перед началом проведения профилактической дезинфекции.

2.1. Организована системная работа по информированию работников о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах личной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.

2.3. Для работников на основании существующих документов и рекомендаций Роспотребнадзора разработаны и направлены правила личной и производственной гигиены, инструкция по профилактике коронавируса для работников, регламент уборки, инструкции по применению дезинфицирующих средств.

2.4. С целью профилактики и борьбы с коронавирусом (COVID-19) проводят профилактическую и текущую дезинфекцию. Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке в Российской Федерации, ведется журнал обработки помещений при коронавирусе. В Инструкциях по применению этих средств указаны режимы для обеззараживания объектов при вирусных

инфекциях.

2.5. Ежедневно перед началом работы всем сотрудникам ответственным лицом измеряется температура тела с занесением результатов термометрии в Журнал термометрии сотрудников журнал измерения температуры сотрудников

2.6. При температуре 37,0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, работник отстраняется от работы и направляется домой для вызова медицинского работника на дом.

2.7. Перед началом работы обслуживающий персонал организации обеспечивается запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза в 3 часа), одноразовых перчаток для использования их при работе, а также дезинфицирующими салфетками, либо кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.

2.8. Работники обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной санитарии.

2.9. Перед началом работы необходимо вымыть руки. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, в том числе после сотового телефона, обращая внимание на околоногтевые пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла с высокой пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами (антибактериальные средства для рук, содержащие не менее 60% спирта, (влажные салфетки или гель)).

2.10. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения.

2.11. Перед дезинфекцией следует приготовить (развести) рабочий раствор дезинфицирующего средства в емкости согласно противовирусному режиму, указанному в инструкции на используемое средство. В отдельной емкости приготовить рабочий раствор дезинфицирующего средства для периодической обработки рук в процессе дезинфекции.

2.12. Дезинфицирующие средства следует хранить в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для посторонних. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении дезсредством изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению.

3. Санитарно-гигиенические требования во время проведения профилактической дезинфекции в помещениях для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

3.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом и обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

3.2. Дезинфекцию следует начинать с уборки более чистых помещений (кабинеты, офисы) и заканчивая более загрязненными (холлы, лестничные проемы, коридоры, санузлы).

3.3. Следует, по возможности, проводить дезинфекцию одновременно с проветриванием.

3.4. Ветошью, смоченной в подготовленном дезинфицирующем растворе, следует протереть поверхности столов, клавиатуры, подоконников, выключателей, предметы обстановки, оборудование.

3.5. После обработки поверхностей использованную ветошь, салфетки необходимо сложить в отдельный мусорный мешок.

3.6. Обработать руки в перчатках на протяжении 1-2 минут в подготовленном дезинфицирующем растворе.

3.7. Приступить к обработке полов.

3.8. Во время проведения профилактической дезинфекции санитарных узлов следует подвергнуть тщательной обработке поверхности выключателей, водопроводных кранов, умывальников, унитазов.

3.9. Дезинфекционная обработка всех контактных поверхностей (выключателей, дверных ручек и поручней, перил, поверхностей столов и спинок стульев, оргтехники) проводится каждые 2-4 часа.

3.10. Правила использования одноразовой медицинской маски:

- надевать маску при выполнении работ по профилактической или текущей дезинфекции; перед тем как взять маску в руки, следует обработать их спиртосодержащим средством или вымыть с мылом;
- надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос, подбородок и плотно фиксировалась (при наличии завязок на маске их следует крепко завязать). Если одна из поверхностей маски имеет цвет, то маску надевают белой стороной к лицу;
- специальные складки на маске следует развернуть, вшитую гибкую пластину в области носа, следует плотно прижать к спинке носа для обеспечения более плотного прилегания к лицу;
- использовать маску однократно, повторное использование маски недопустимо;
- менять маску необходимо каждые 3 часа или чаще. Если маска увлажнилась, ее следует незамедлительно заменить на новую;
- после использования маски, выбросить её в пакет, который плотно завязать, а затем выбросить в пакет для отходов;
- снять перчатки и вымыть руки с мылом (30-40 секунд);
- после мытья, руки следует обработать спиртосодержащим кожным антисептиком;
- после обработки рук, при необходимости, надеть новую маску.

3.12. Во время работы по проведению дезинфекции помещений следует соблюдать меры предосторожности, приведенные в эксплуатационной документации предприятия – изготовителя дезинфицирующих средств.

4. Алгоритм действий в случае подозрения в заболевании новой коронавирусной инфекцией.

4.1. Работник, у которого имеются подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19, извещает своего непосредственного руководителя о своем состоянии.

4.2. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению пациента в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.

4.3. Использовать бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения (при наличии). В случае необходимости, обеспечить проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации.

4.4. В случае выявления заболевших после удаления больного и освобождения помещений от людей проводится дезинфекция силами специализированных организаций. Для обработки используют наиболее надежные дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и кислородактивных соединений. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов, санузлов. При обработке поверхностей применяют способ орошения. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.

4.5. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 уполномоченное должностное лицо формирует сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомляет руководителя и всех работников, входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

5. Санитарно-гигиенические требования по окончании проведения профилактической дезинфекции в помещениях для предупреждения распространения коронавируса

5.1. Уборочный инвентарь следует замочить в дезинфицирующем растворе методом погружения, затем высушить и убрать в отведенное место.

5.2. После проведения профилактической дезинфекции обслуживающий персонал должен:

- обработать руки в перчатках рабочим дезраствором (1-2 мин.), приготовленном заранее в отдельной емкости и используемым только для обработки рук в перчатках;
- обработать руки в перчатках (1-2 мин.) в емкости с рабочим дезинфицирующим раствором;
- снять маску, не касаясь лица наружной ее стороной и поместить в мусорный мешок;

- обработать руки в перчатках (1-2 мин.) в емкости с рабочим дезинфицирующим раствором;
- снять перчатки и поместить их в мусорный мешок;
 - тщательно (не менее 30 сек.) помыть руки с мылом;
 - протереть руки и открытые участки лица и тела спиртосодержащим кожным антисептиком.

6. Ответственность.

6.1. Обслуживающий персонал несет ответственность за соблюдение требований настоящей инструкции по проведению дезинфекции помещений организации при коронавирусной инфекции.

6.2. При наличии признаков коронавируса необходимо соблюдать режим самоизоляции. В случае нарушения требований и создания угрозы распространения заболевания коронавирусной инфекцией или его распространения, распространителя могут привлечь к уголовной ответственности по статье 236 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

6.3. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на директора.

С инструкцией ознакомлен (а)

«12» августа 20 2020

РЛ / Крамар Н.В. /

ИНСТРУКЦИЯ

по применению средства дезинфицирующего «Жавель Солид» производства фирмы «Евротаб Операсьон» (хлорные таблетки).

Инструкция разработана на основе инструкции ФБУН «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Средство представляет собой таблетки круглой правильной формы белого цвета со слабым запахом хлора, массой $3,2 \pm 0,2$ г, на основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты $85 \pm 10\%$ и вспомогательных компонентов. Действующим веществом является активный хлор, выделяющийся при растворении в воде основного компонента. Масса активного хлора в одной таблетке $1,5 \pm 0,2$ г, время распадаемости таблетки - не более 5 мин.

Срок годности средства - 5 лет в невскрытой упаковке изготовителя, рабочих растворов - 5 суток.

Средство поставляется в 1 кг герметично закрывающихся пластиковых банках.

1.2. Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая споры бацилл, особо опасные инфекции, микобактерии туберкулеза - тестировано на *Mycobacterium terrae*), вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, коронавирусов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. штаммов А H5N1 и А H1N1, аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии), грибов рода Кандида, дерматофитов, плесневых грибов.

1.3. Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок, к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу; по классификации К.К. Сидорова при парентеральном введении (в брюшную полость) относится к 4 классу малотоксичных веществ; при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях (пары) – высокоопасно, согласно классификации ингаляционной опасности средств по степени летучести (2 класс опасности); при непосредственном контакте вызывает выраженное раздражение кожи и слизистых оболочек глаз; не обладает сенсибилизирующим свойством.

Рабочие растворы 0,015% - 0,06% (по АХ) в виде паров не вызывают раздражения органов дыхания, при однократном воздействии не оказывают местно-раздражающего действия на кожу.

Рабочие растворы с содержанием активного хлора от 0,1% и выше при использовании способами орошения и протирания вызывают раздражение верхних дыхательных путей и слизистых оболочек глаз.

ПДК для хлора в воздухе рабочей зоны - 1 мг/м³.

1.4. Средство предназначено для:

- обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, игрушек, резиновых и пропиленовых ковриков, обуви из резины, пластмасс и других полимерных материалов при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции

- для проведения профилактической дезинфекции в учреждениях образования, культуры, отдыха, объектах курортологии, спорта;

- для заключительной дезинфекции в детских учреждениях;

- для обеззараживания поверхностей, пораженных плесневыми грибами;

- для проведения генеральных уборок;

- для использования населением в быту - строго в соответствии с Этикеткой для быта.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем растворения соответствующего количества таблеток в водопроводной питьевой воде комнатной температуры (таблица 1).

2.2. Для придания моющих свойств рабочим растворам средства к ним можно добавлять моющее синтетическое средство в количестве: 5 г на 1л раствора, 25 г на 5л раствора, 50 г на 10л раствора (0,5% растворы).

Таблица 1

Приготовление рабочих растворов средства из таблеток

Концентрация рабочего раствора по АХ, (%)	Количество таблеток (шт.), необходимых для приготовления рабочего раствора (л)			
	5л	10л	10л	60л
0,0025	-	-	-	1
0,015	-	1	2	6
0,03	1	2	4	12

Примечание: знак (1) означает, что масса активного хлора в одной таблетке - 1,5 г

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ

3.1. Растворы средства применяют для обеззараживания объектов, указанных в п. 1.4.

3.2. Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, орошения, погружения и замачивания.

3.3. Поверхности в помещениях, жесткую мебель, поверхности приборов, аппаратов протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства 150 мл/м² обрабатываемой поверхности. По окончания дезинфекции следует провести влажную уборку, проветрить помещение; паркетный пол, полированную и деревянную мебель протереть сухой ветошью.

3.24. Режимы дезинфекции объектов при различных видах инфекций приведены в таблице 2.

Таблица 2

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Жавель Солид» при бактериальных (кроме туберкулеза) и вирусных инфекциях

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора по активному хлору (АХ), %	Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов и т.д.,	0,015	0,015	Протирание или орошение
	0,03	0,03	

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. К работе со средством не допускаются лица с повышенной чувствительностью к хлорактивным средствам.

4.2. При приготовлении рабочих растворов в концентрациях до 0,3% не требуется

применения средств индивидуальной защиты.

4.3. Работы с растворами 0,015% концентрации по активному хлору способом протирания можно проводить в присутствии обучающихся.

4.4. Работы с растворами 0,03-0,06% концентрации по активному хлору не требуют использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, но работы следует проводить в отсутствии обучающихся.

4.5. Все работы со средством и его растворами проводят с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.7. Ёмкости с рабочими растворами для дезинфекции игрушек, уборочного материала должны иметь крышки и быть плотно закрыты.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1. При несоблюдении мер предосторожности возможны острые раздражения органов дыхания (першение в горле, кашель, обильные выделения из носа, учащенное дыхание, возможен отек легких) и слизистых оболочек глаз (слезотечение, резь и зуд в глазах), может наблюдаться головная боль.

При появлении первых признаков острого раздражения дыхательных путей необходимо пострадавшего вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, обеспечить покой, согревание, прополоскать горло, рот, нос, дать теплое питье или молоко. При необходимости обратиться к врачу.

5.2. При попадании средства на кожу смыть его под проточной водой.

5.3. При попадании средства в глаза следует промыть их под проточной водой в течение нескольких минут. При раздражении слизистых оболочек закапать в глаза 20% или 30% раствор сульфацила натрия.

5.4. При попадании средства в желудок следует выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ

6.1. Средство транспортируют при температуре от минус 200 до плюс 350С всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность продукта и тары.

6.2. Средство хранят в плотно закрытых полимерных емкостях в оригинальной упаковке предприятия-производителя в сухом темном помещении при температуре от 00 до плюс 350С отдельно от окислителей, кислот, лекарственных препаратов и пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

6.3. При рассыпании средства следует использовать индивидуальную защитную одежду (комбинезон, сапоги) и средства индивидуальной защиты: для органов дыхания- универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В или промышленный противогаз, для глаз - герметичные очки, для кожи рук - резиновые перчатки.

При уборке рассыпанного средства следует собрать таблетки в емкости и отправить на утилизацию. Остатки промыть большим количеством воды, не допуская нейтрализации кислотой, т.к. при этом возможно выделение газообразного хлора.

6.4. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

С инструкцией ознакомлен (а)

« ___ » _____ 20___ / _____ /